

Doses e infusão de Bloqueadores Neuromusculares

Solução-padrão e doses						Velocidade de infusão para paciente de 70Kg		Diferença de velocidade de infusão a cada 10Kg*
Medicamento	Solução padrão**	Concentração da solução	Estabilidade da solução	Dose mínima	Dose máxima	Velocidade de infusão mínima (mL/h)	Velocidade de infusão máxima (mL/h)	mL/h
Rocurônio 50mg/5mL	25mL (250mg) em 75mL	2,5mg/mL	24h	0,48mg/Kg/h	0,72 mg/Kg/h	13	20	2
Cisatracurio 10mg/5mL	50mL (100mg) em 50mL SF	1mg/mL	24h	0,06mg/Kg/h	0,18 mg/Kg/h	4	13	1
Pancurônio 4mg/2mL	20mL (40mg) em 80mL SF	0,4mg/mL	24h	0,048mg/Kg/h	0,102 mg/Kg/h	8	18	2
Vecurônio 4mg (Reconstituir em 1mL de água)	10mL (40mg) em 90mL SF	0,4mg/mL	24h	0,048mg/Kg/h	0,102 mg/Kg/h	8	18	2
Atracurio 25mg/2,5mL	25mL (250mg) diluidos em 75mL SF	2,5mg/mL	24h	0,3mg/Kg/h	1,2 mg/kg/h	8	34	2

